



TRAJECT VOOR HOND EN KAT

Metabool Balans Traject

Bij diabetes, insulineresistentie en overgewicht reageert het lichaam minder goed op insuline. Laaggradige ontsteking vanuit de darm en een tekort aan energie in de cellen spelen daarbij mee. Dit traject werkt in drie fasen aan darm, insulinegevoeligheid en celenergie, altijd naast de behandeling van de dierenarts.

Uitsluitend in overleg met uw dierenarts

- Verander de insulinedosering nooit zelf. Het traject kan de insulinebehoefte verlagen; laat de bloedsuiker daarom regelmatig controleren.

Voor wie?

Diabetes, naast insuline

Insulineresistentie

Overgewicht

Leververvetting of verhoogde leverwaarden

Spierverlies

Aanhoudende vermoeidheid

Het traject in één oogopslag

Fase 1

WEEK 1 TOT 6

Darm en ontsteking

Fase 2

WEEK 6 TOT 14

Insulinegevoeligheid

Fase 3

WEEK 14 TOT 22

Celenergie

Voeding en beweging

- Vers, gevarieerd vlees met gemalen groenten en voldoende dierlijk eiwit voor spierbehoud.
- Vaste maaltijdtijden, zeker bij insuline.
- Dagelijks rustig bewegen en bij overgewicht geleidelijk opbouwen. Geen zware inspanning bij een instabiele diabetes.

Volgt uw dier een dieet van de dierenarts? Stap alleen in overleg over. Een andere voeding verandert de insulinebehoefte.

Wat u kunt verwachten

Week 1 tot 6

Een stabielere darm, meer energie en betere ontlasting.

Week 6 tot 14

Betere benutting van glucose; de insulinebehoefte kan dalen.

Week 14 tot 22

Meer uithoudingsvermogen, spierbehoud en een stabielere bloedsuiker.

Vanaf maand 6

Een stabiel gewicht en een betere conditie.

De darm en het immuunsysteem stabiliseren en laaggradige ontsteking verlagen.

Prebiotic Fibers	Voeden de gunstige darmbacteriën.
Biofilm Balance	Breekt schadelijke biofilm in de darm af.
Liposomale Vitamine C	Antioxidant die cellen beschermt.
Liposomale Curcumine	Remt ontsteking en leververvetting.
Myc Immune Complex	Bètaglucanen voor balans in het immuunsysteem.

De cellen weer gevoeliger maken voor insuline.

Metabolic Balance	Berberine en NAC ondersteunen de suikerstofwisseling en de lever.
Omega 3	Voor soepele celfmembranen en insulinegevoeligheid.
PEA Complex	Remt ontsteking en pijn.

Longevity Support en **Liposomale Co-enzym Q10** ondersteunen de energieproductie in de cellen, **Relax Support** levert magnesium en **Liposomaal Glutathion** beschermt de lever.

Controle

Laat bloedsuiker en leverwaarden controleren voor de start en bij elke nieuwe fase. Bij diabetes bespreekt u de bloedsuikercurves met de dierenarts.

Op indicatie

Bij veel stress: Adaptogen Complex. Bij uitgesproken darmklachten eerst het Darm Herstel Traject.

Dosering. Eerste maand tweemaal daags de therapeutische dosering, daarna eenmaal daags, volgens het advies van uw dierenarts.

Te lage bloedsuiker herkennen

- Signalen: trillen, wankelen, onrust, sufheid of een aanval. Wrijf honing of glucosestroop op het tandvlees en bel direct de dierenarts.
- Bij katten kan diabetes in remissie gaan en daalt de insulinebehoefte soms snel. Extra controle is dan nodig.
- Metabolic Balance niet starten bij een instabiele diabetes zonder begeleiding van de dierenarts.

PERSOONLIJK ADVIES VAN UW BEHANDELAAR

Naam dier

Startdatum

Dosering

Eventueel aanvullend consult met behandelaar

Eventuele aanvullingen uit andere trajecten